NOTA DISTRIBUCIONAL SOBRE *Selenops* LATREILLE (ARANEAE; SELENOPIDAE) PARA LA ARGENTINA.

La familia Selenopidae tiene una amplia distribución especialmente tropical y subtropical. Su rango de distribución en el Hemisferio Occidental se extiende desde el Sur de América del Norte hasta Paraguay y el norte de la Argentina, en América del Sur. (Muma, 1953. ***Amer. Mus. Novit.***, 1619: 1).

En la Argentina se ha citado material de: CHACO: Villa Occidental (Holmberg, 1876: ***An. Agric. Rep. Arg.***: 26); JUJUY: Quinta (Tullgren, 1905: ***Ark. Zool.***, 2,(19): 63); SALTA: Abra Santa Laura; CORDOBA: Cabana (Mello Leitão, 1941: ***Revta Mus. La Plata, Sec. Zool.***, 2: 165); LA RIOJA: Castro Barros; SANTIAGO DEL ESTERO, Colonia Dora y Campo Gallo (Mello Leitão, 1942: ***Revta Mus. La Plata, Sec. Zool.***, 4: 387); MISIONES, Iguazú, El Dorado y Puerto Victoria (Birabén, 1953. ***Mis. Estud. Patol. reg. arg.***, 24: 83-84).

De acuerdo a los ejemplares colectados por el autor y a la revisión del material araneológico de la Fundación Miguel Lillo (TUCUMAN), se citan ahora como nuevas localidades de colecta a: SALTA: Hickman, Piquete, Cabado, Tartagal y Costa del Bermejo, a 80 Km. de Embarcación; TUCUMAN: San Miguel de Tucumán, La Soledad (Depto. Cruz Alta) y Tafí Viejo; CORDOBA: Alta Gracia, Yacanto (San Javier) y San Esteban; CHACO: Ciervo Petizo; CATAMARCA: Tinogasta; FORMOSA: Laguna Oca y SANTIAGO DEL ESTERO: Depto. Capital.

Por lo que el área de distribución del género ***Selenops***, en la Argentina, no sobrepasa de la región Centro-Oeste del país.

José Antonio CORRONCA
Fundación Miguel Lillo